

ORIGINAL MEROPENEM since 1999¹

유한메로펜[®]

주사 500mg

Meropen active ingredient : Meropenem (MEPM)

THE RELIABLE PARTNER YOU CAN TRUST



Ultra-broad spectrum of activity^{2,3,*}



High stability to ESBLs⁴



Well tolerated, Low incidence of
nausea and vomiting^{5,6,†}



The carbapenem
indicated in meningitis^{1,7,8}



ESBL: Extended-spectrum β -lactamase

*Meropenem has a very broad spectrum of in vitro activity against Gram-positive and Gram-negative pathogens, including extended-spectrum β -lactamase(ESBL)- and AmpC-producing Enterobacteriaceae.³

†In the safety analysis including 46 clinical trials, nausea and vomiting was reported in 1.4% to be related to treatment with meropenem.⁵

References.

1. 식약처 의약품 제조품목 허가증, 2020.4.24 2. J Antimicrob Chemother 1995; 36(Suppl A): 1-17 3. Drugs 2008;68(6):803-838 4. J Antimicrob Chemother 1996; 41(Suppl D):25-41 5. Scand J Infect Dis 1999;31(1):3-10 6. J Antimicrob Chemother 1995; 36(Suppl A): 179-189 7. Diagn Microbiol Infect Dis 1996; 31: 405-410 8. Antimicrob Agents and Chemother 1995; 39(5): 1140-1146

제품요약정보

유한메로펜[®] 주사 0.5그램 [원료약품 및 분량] 1 바이알 중 유효성분: 메로페남-건조탄산나트륨(평균) 604mg(메로페남으로서 500mg(약기)) [성상] 백색-담황색의 결정성 분말을 충전한 바이알 [효능·효과] 1. 유효균종: 제품 허가사항 참조 2. 적응증: 패혈증, 표재성 화농성질환, 림프절염, 영문주위농양, 외과 장염외과 영역 감염증(골수염, 관절염, 창상감염), 호흡기 감염증(폐렴, 폐도주위농양, 만성호흡기질환의 2차 감염, 폐화농양, 농흉), 오토감염증(신우신염, 복잡성방광염), 간 담도감염증(담낭염, 담관염, 간농양), 복막염, 산부인과영역 감염증(자궁부속기염, 자궁내감염, 자궁방결합직염), 이비인후관 감염증(중이염, 부비동염), 세균성 수막염(3개월 이상의 소아), 호중구감소증 환자에서의 의심되는 감염, 남포성 섬유증 [용법·용량] • 성인: 메로페남수화물으로서 1일 0.5 ~ 1g(약기)을 2 ~ 3회 분할하여 30분 이상에 걸쳐 정적정맥주사한다. 병환성 폐렴, 복막염, 호중구감소증 환자에서의 의심되는 감염, 패혈증에는 8시간마다 1g(약기)을 정적정맥주사한다. 남포성 섬유증, 수막염에는 8시간마다 2g(약기)을 정적정맥주사한다. • 소아: 3개월 이상의 소아에 대한 세균성 수막염의 경우 병원균의 감수성과 환자의 상태, 감염의 종류에 따라 8시간마다 체중 kg 당 40mg을 30분 이상에 걸쳐 정적정맥주사한다. 또한 중상에 따라 적절히 증감하지만 중증, 난치성 감염증에는 1일 2g(약기)까지 증량할 수 있다. ※ 신장에 환자 등 기타 자세한 용법·용량은 제품 허가사항 참조 [사용상의 주의사항] • 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 이 약에 대해 쇼크의 병력이 있는 환자 2) 발프로산나트륨을 투여 받고 있는 환자(이 약과의 병용투여에 의해 발프로산의 혈중농도가 저하되어 간질발작이 재발할 수 있다.) 3) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 대해 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자 4) 다른 카바페네믹 계열항생제에 대해 과민반응(예, 심각한 피부 반응)의 병력이 있는 환자 5) 다른 베타락탐계 항생물질(예, 페니실린 또는 세팔로스포린)에 중증의 과민반응(예, 아나필락시스반응, 중증의 피부반응) 환자 [저장방법] 밀봉용기, 실온보관 [개장연월일] 2019. 5. 14 [제조 판매자] ㈜유한양행 본사: 서울 동작구 노량진로 74, 공장: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219 홈페이지: www.yuhan.co.kr 소비자상담실: 080-024-1188 (수신자 요금부담) ※자세한 허가사항은 식약처 의약품통합정보시스템 홈페이지 (<http://nedrug.mfds.go.kr/>)를 참조하여 주시기 바랍니다. 요약 허가사항에 반영되지 않은 허가 변경이 상기일자 이후에 있을 수도 있습니다.



유한양행

MRP-A11-094-202006